Albaranzeuli bianco

0MTP13

INRA SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s496-500 0Mtp13 PROPERTY OF THE SERVICE

Albaranzeuli bianco 7.18 \$ 10 \$













DESIGNATION: Albaranjeuli bianco CLOS A PLANCHE 18 RANG S Souche 10. Vigueur : PORT : érig - ½ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : Date de Maturité : Pourriture : 0 14 <u>GRAPPE</u> : G - (N) - P : L - (N) - C BAIE : TG - G P disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : BI - Gr - Rs - R5 - H SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s14 avec pépins - apyrène 34 JUS : inc - coloré s5 1

CLOS 7 RANG 18 souche 5 10 Désignation : Albaranzeuli bianco Année : CHARGE : 28.7 Véraison : +4 12-9.88 Maturité : Pour. : 0 Mill .: 0,5 GRAPPE : (G)-M- P - Dim.: 18 Vigueur : 1,5 PORT : érig - (1/2) érig - couché Année : TG -G- M - P - Dim.: 19 disc. sph -ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. sl 1 Avec (pépins - apyrène s2 2 s3/2 JUS : inc. / coloré s5 1

Année: 1985
Emplacement... 7. 18 S 10. Désignation. Albaranzeuli bianco

| | 1 Nombre ! Total | DATES | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|-----|-----|------|--|--|--|--|--|
| | ! d'yeux | 1-4: | . 1 | 1 1 | 1 1 | | | | | |
| 1 | 2 | 111 | 1 | 1 | 1 1 | | | | | |
| 2 | 1 2 | 11: | 1 | 1 | i i | | | | | |
| 3 | : g | | 1 | 1 | 1 1 | | | | | |
| 4 | 1 2 | 11: | 1 | 1 | 1 1 | | | | | |
| 5 | : 2 | 11 | 1 | i | 1 21 | | | | | |

Dle 1-4-85

| | Mombre | 1 | DATES | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------|---------|---------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | Total d'yeux | 1 1/4 3 | 28,5 | 1 | # 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 | 1 | | | | | |
| 1 | : 4 | 1 1 | ! 3 ~! | 1 | j. | 1 | | | | | |
| 2 | 1 2 | 10 | 1 / ~ 1 | 1 | Ī | ! | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | ! | 1 | | | | | |
| dj. | 1 4 | 1 / | 1 2 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 5 | : 4 | 10 | 1 2 2 | <u>1</u> 1 | 1 1 | 1 | | | | | |

De 28.3.86 +3

| | Année: 1987 Emplacement718.5.10 | Désignation. M. Paramapuli bianco |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
|--|------------------------------------|-----------------------------------|

| | <u>t</u> | DATES | | | | | | | | |
|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| d'yeux | 27,3 | 3/13 1 | 1 | 3. F | ! ! | | | | | |
| Ĺ | ! 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 3 | 1 0 | | 9 4 | 1 1 | 1 | | | | | |
| ill | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | | | | | |
| 4 | ! 1 | ! & × ! | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| t _i | 1 1 | 9 4 | 1 | 1 1 | 1 | | | | | |
| | | Total ! | | | | |

31.387

ANNEE 1988

NOM Nasco

EMPLACEMENT 7 18 511

205302

| | 0033 | - 1-2 | | | | | | | | - |
|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| Souche | Nbre yeux | Débour début | rrement mi/déb | Nbre grap | Ferti- lité × | Flo début | raisor mi/f | Vé début | raison mi/v | Maturité × |
| 1 2 3 4 5 | 4 3 3 3 4 | Pourrit | ure : | 4044 | Port : | | Vig | | | 5.3.88 |
| | | | | | | | 4 1 | | | |

ANNEE 1987 NOM Albaranzeuli biancemplacement 7 18\$10

| Souche | Nbre yeux | | rement mi/déb | | Ferti- lité | Flo début | oraiso mi/f | 1 | Vé début | raisor mi/v | Maturité |
|-----------|--------------|------------------------------|---|-----------|----------------|--------------|----------------|------|-------------|-------------------|----------|
| 3 . 4 . 5 | 4 3 2 4 4 | 31.3 23.3 23.3 23.3 | 7, 4 3,4 27,3 31,3 31,3 44 | 2 1 0 2 1 | 3,5 | 1.6 | 6.6 | 11.6 | 3,8 | 6,8 +2 Port | 149 |

nie

ANNEE 1988
NOM Albaranzeuli bianco EMPLACEMENT 7 18 \$ 10

| Souche | Nbre yeux | Débourr début | | Nbre grap | Ferti- lité | | oraiso mi/f × | | Vé début | raisor mi/v × | | Maturité × |
|--------|--------------|------------------|--|--------------|----------------|------|---------------------|-----|-------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 3 1 | 3 3 | | | 1 2 2 1 | 4 | 31.5 | 3.6 | 6 C | 28.7 | 1.8 | 8.8 | 5-9-88 |
| 5 | | | The second secon | | | | 3,6 | | | +21 | | +3 |

Pourriture: 0 Port: mi lugi Vigueur: 1,5 faible

NOM Albaranzeuli bian EMPLACEMENT 7 18 \$ 10 ..

| Souche | | Débou début | rement mi/déb | grap | Ferti- lité | Flo début | raison mi/f | | | raison mi/v | fin | Maturité |
|------------------|--------|----------------|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|------|------|----------------|------|----------|
| 1 2 3 4 | | | | | | 18.5 | 21.5 | 23.5 | 1617 | 19,7 | 23,7 | |
| Pot | ırritu | re : 0 | | Mill. | : 0 | Port | | | 1 | /igueu | r: | |

Albaranzenli bianco

DESIGNATION: EMPLACEMENT:

(A) BOURGEONNEHUNT

Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

roux - carminé 2 - à liséré carminé 3
hronzées 6 - entièrement

bronze 7 - Vert 8 -

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées () - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 · veloutées 6 aranéeuses 7/duveteuses 6 cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9

Dans le cas où la première feuille détachée est à l'a' la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille d'attribute.

Albaranzeeli bianco 7- 18 \$ 10 s.5

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 7 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 5.7

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Albaranzeuli bianco 7-18 \$10 s.2

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

subcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation: Albaranzeuli bianco Emplacement: 48 \$ 10 s. Z

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférioure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvetoux 8 cotonneux 9.
- 35 limbs: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - limbe: plan 1 on gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
 - lobos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface : unic 1 ondulée 2 finoment bullée 3 moyennement bullée (7 grossièrement bullée 4 gauffrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérioure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert clair 1 vert franc 2 vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre (-) séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particllement coloré 2 autre Blest

2342 Albaranzeuli biano Nº d'ordre : 7-18\$100-5 Désignation : Emplacement : 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3 (dimensions: 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 / Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.) 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 + Hoyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 19 × 19). 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) - prvinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 6 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (1.) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6- Juteuse 7- molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutro - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) - apyrère 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3 31 - A pédicelle de coulour ; verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 1 - moyer 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile () anes

Albaranzeuli bianco 7-18 \$ 10 0.5

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effaces (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus fonce (6) de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2)

: saillant (1) - eff (2)

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : Désignation: Albaranseuli bianco Emplacement : 7. 185 10 8.5

: 1 - (2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - 8 - 9 L1/L2 L2/L : (10) - 11 : 12 - 13 - (14) - (15) - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - (19) - (20) Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-39 Fond sinus lateral Sup. en V: (268) - en U: 269 - autre: (270) Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : 10 - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - (46) - (17) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre-dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 : 60 - 61 - 62

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Angle des nervures L3 L'3